

第3類医薬品

22錠

ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

南天のど飴Y(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要などきに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) 【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。 3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。 **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ **用法・用量** 食

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal



使用
期限
製造
番号

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白樺字永谷2604-5

南天のど飴のブランドサイトはこちら
<https://nodoame.jp>

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 0120-149-931



067485
TIS1804

①