

# 第3類医薬品

# 22錠

✂ ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

## 南天のど飴S(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。  
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

**使用上の注意【してはいけないこと】**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) 【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。 3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。 **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのはれ **用法・用量** 食前

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

**保管および取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 製造販売元

常盤薬品工業株式会社  
大阪市中央区安土町3-5-12  
NOEVIR GROUP

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

南天のど飴のブランドサイトはこちら

<http://nodoame.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 製造

(独)医薬品医療機器総合機構 番号

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>

0120-149-931

1錠あたり7kcal

# 4987156 21197 8



PE, 金属

067495  
TISE501