

第3類医薬品

✂ ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

南天のど飴PA(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要などきに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)【相談すること】1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ **用法・用量** 食

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal

使用
期限

製造
番号

常盤薬品工業株式会社

NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白樫字永谷2604-5

南天のど飴のブランドサイトはこちら

<https://nodoame.jp>

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
副作用被害救済制度 0120-149-931



MADE IN JAPAN

067535

TISD101

PE,金属

①